

Vergleich der im kantonalen Darmkrebsvorsorgeprogramm angebotenen Vorsorgeuntersuchungen

	Blut-im-Stuhl Test*	Darmspiegelung
Entdeckung des Darmkrebses bereits im Frühstadium**	Sehr häufig (70 %)	Sehr häufig (70 %)
Sicherheit, dass kein Krebs verpasst wurde	Hoch	Extrem hoch, wenn Darmspiegelung vollständig und qualitativ gut durchgeführt
Sicherheit, dass keine grössere Vorstufe verpasst wird	Mittel, deshalb Wiederholung nach 2 Jahren	Hoch
Vorbereitung	Keine nötig	Darmreinigung kann als unangenehm empfunden werden
Schmerzen bei der Untersuchung	Keine	Dank Beruhigungsmitteln selten
Komplikationen	Keine	Selten möglich (Blutungen, Darmwandverletzung)
Beschwerden nach der Untersuchung	Keine	Kommen für Stunden bis wenige Tage vor (selten länger)
Garantie der Qualität der Untersuchung	Sehr hoch, im Labor gesichert	Generell hoch, von der Vorbereitung und vom Untersucher abhängig
Durchführung	Einfach, zu Hause machbar (Dauer wenige Sekunden)	In der Arztpraxis oder im Spital (Dauer ca. 45 Minuten), es muss mit langen Wartezeiten bis zur Untersuchung gerechnet werden (2 – 3 Monate)
Durchschnittlicher Arbeitsausfall	Keiner	Meistens 1 Tag
Notwendige Wiederholungen	Alle 2 Jahre empfohlen	Alle 10 Jahre empfohlen

*qFIT (quantitative Faecal Immunochemical Test): Nachweis von nicht sichtbarem Blut im Stuhl (in ca. 8 % der Fälle positiv; diese brauchen anschliessend eine Darmspiegelung)

**ohne Vorsorge werden weniger als 20 % in einem Frühstadium entdeckt